

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 31-3-67 630628

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

25 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 4 au Bulletin Technique N° 78 de Mars 1967

1967-8

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Une nouvelle fois l'évolution du Black-Rot est très précoce cette année. Dans les meilleures conditions de conservation, les Périthèces sont arrivés à maturité le 15 mars, c'est-à-dire avant le débourrement de la vigne. Des projections d'Ascospores peu nombreuses ont même été observées pendant les pluies du 26 au 29 mars alors que les premiers bourgeons venaient à peine d'éclater.

On arrive donc à la période des premières contaminations possibles, car les Périthèces et les bourgeons de la vigne vont continuer à évoluer parallèlement. Néanmoins, ces risques d'attaques restent localisés. Ils ne pourront se produire qu'à proximité des vignes incultes où des grappes de raisins ont été détruites par la maladie en 1966.

Donc les vignes débourrées situées dans les environs des parcelles abandonnées doivent être traitées dès à présent pour éviter les premières attaques de Black-Rot.

Par la suite, le traitement de ces vignes en situation particulière sera renouvelé selon la rapidité de leur croissance et l'importante des pluies.

La Station d'Avertissements Agricoles ne diffusera cette année de Bulletins spéciaux que si la maladie prend une extension dangereuse, ce que nous ne redoutons pas actuellement en raison des faibles attaques de l'an dernier.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Comme nous le redoutions, les dernières pluies ont provoqué de très nombreuses projections d'Ascospores. En outre, les premières taches viennent d'être découvertes sur les pédoncules des fleurs de variétés précoces.

La période pluvieuse risquant de se poursuivre et les produits ayant pu être délavés, il serait bon de renouveler le traitement précédent à la fin de la semaine.

Hoplocampes des Poires : Des pontes sont déposées sur les variétés à floraison précoce depuis la mi-mars en particulier dans les vergers d'amateurs.

Les éclosions sont générales depuis le 25 mars. Il est donc recommandé de traiter (en mouillant abondamment) avec une spécialité à base d'HCH, de Lindane, ou de Parathion au fur et à mesure de la défloraison (protection des abeilles).

Ce traitement n'est conseillé que pour les plantations habituellement attaquées, ce qui est très rarement le cas des vergers intensifs.

.../...

P 230

.../...

Araignées rouges (*Panonychus ulmi*) : Les éclosions des oeufs d'hiver débutent dans la plupart des vergers de la Circonscription. Toutefois, il est encore trop tôt pour intervenir contre les formes mobiles. Un Bulletin ultérieur précisera l'époque la plus judicieuse pour effectuer un traitement acaricide.

INFORMATIONS

PROTECTION DES ABEILLES

Nous rappelons que la plupart des insecticides et acaricides ne doivent pas être utilisés pendant la période de pleine floraison des arbres fruitiers en raison de leur toxicité à l'égard des abeilles.

Seules les spécialités commerciales à base d'une des matières actives ci-dessous sont reconnues non dangereuses :

- Roténone, Pyréthrine, Toxaphène, Polychlorocamphane, Endosulfan, Diéthion, Phasalone, Dicofol, Thioquinox.

Bordeaux, le 30 mars 1967

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU